

ANEXO 11
MEDICAMENTOS INCLUIDOS EN LA DOTACIÓN
REGLAMENTARIA DE LOS BOTIQUINES A BORDO.
EFFECTOS, CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.
CONDICIONES DE USO Y CONSERVACIÓN

CAJÓN 1: APARATO CARDIOVASCULAR Y ANTIHEMORRÁGICOS

Código ATC	Principio activo	Forma farmacéutica	Acción-efecto	Contraindicaciones y precauciones	Advertencias, condiciones de uso y conservación
C01CA24	EPINEFRINA (ADRENALINA)	Solución en jeringa pre cargada (autoinyector).	<ul style="list-style-type: none"> - Estimulante cardíaco. - Simpaticomimético. - Tratamiento de emergencia en shock anafiláctico o reacción alérgica grave. 	<p>NO TOMAR EN CASO DE...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alergia a este medicamento. - Antecedentes de problemas cardíacos. - Aumento de la tensión ocular. (glaucoma). - Estrechamiento de los vasos sanguíneos (arterioesclerosis). <p>PRECAUCIÓN EN CASO DE...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diabetes. - Tensión arterial alta. - Problemas psiquiátricos (neurosis). - Hipertiroidismo. - Embarazo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Un solo uso (desechar inmediatamente el autoinyector tras su utilización). - No debe emplearse si la solución es de color pardo o contiene precipitados. - Inyectar en cara externa del muslo. - Conservar el envase protegido de la luz. - No refrigerar o congelar.
C01DA	NITROGLICERINA	Comprimidos sublinguales.	Antianginoso.	<p>NO TOMAR EN CASO DE...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alergia al medicamento. - Infarto de miocardio reciente. - Shock circulatorio, anemia. - Traumatismo craneoencefálico. <p>PRECAUCIÓN EN CASO DE...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Embarazo. - Aumento tensión ocular. - Anemia. Hipotiroidismo. - Hipotensión. - Problemas cardíacos. - Enfermedades hepáticas o renales graves. 	<ul style="list-style-type: none"> - Introducir el comprimido en la boca, masticar seguidamente y situarlo debajo de la lengua. - Evitar llevar el envase cerca del cuerpo, el propio calor corporal puede afectar al medicamento. - Evitar el consumo de bebidas alcohólicas.
C03CA01	FUROSEMIDA	Ampollas.	Diurético.	<p>UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MÉDICA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Conservar las ampollas resguardadas de la luz. - No utilizar si la solución adquiere color parduzco. - No se aconseja el manejo de maquinaria peligrosa o de precisión durante el tratamiento.

CAJÓN 1 (Continuación)

Código ATC	Principio activo	Forma farmacéutica	Acción-efecto	Contraindicaciones y precauciones	Advertencias, condiciones de uso y conservación
C03AA03	HIDROCLOROTIAZIDA	Comprimidos.	Diurético.	UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MÉDICA	<ul style="list-style-type: none"> Evitar exposición directa a la luz del sol o ultravioleta sin protección adecuada (filtros solares, ropa). No se aconseja el manejo de maquinaria peligrosa o de precisión durante el tratamiento.
G02AB01	METILGOMETRINA	Solución oral (gotas). Solución inyectable.	Estimulante uterino y vasoconstrictor.	UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MÉDICA	<ul style="list-style-type: none"> Sólo obligatorio en buques con mujeres a bordo. Proteger de la luz. Conservar entre 2-8° (en nevera).
	AMLODIPINO	Comprimidos.	Antihipertensivo.	PRECAUCIÓN EN CASO DE... <ul style="list-style-type: none"> Problemas cardíacos. Insuficiencia renal. Embarazo. 	<ul style="list-style-type: none"> No se aconseja el manejo de maquinaria peligrosa o de precisión durante el tratamiento.
C09AA01	CAPTOPRIL	Comprimidos.	Antihipertensivo.		<ul style="list-style-type: none"> No se aconseja el manejo de maquinaria peligrosa o de precisión durante el tratamiento.

■ Sólo en Botiquines tipo A.

CAJÓN 2: DIGESTIVO

Código ATC	Principio activo	Forma farmacéutica	Acción-efecto	Contraindicaciones y precauciones	Advertencias, condiciones de uso y conservación
A02AD	ALGELDTRATO + HIDRÓXIDO DE MAGNESIO	Suspensión oral. Comprimidos.	Antiácido.	NO TOMAR EN CASO DE... – Problemas renales. – Embarazo.	– Agitar enérgicamente el frasco antes de su uso (suspensión). – Los comprimidos deben masticarse perfectamente antes de tragarse. Después, a continuación, tomar un vaso de agua. – No tomar con leche.
A02BC01	OMEPRAZOL	Cápsulas.	Antiulceroso.	UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MÉDICA	– Tomar las cápsulas enteras, sin masticar ni triturar.
A02BA02	RANITIDINA	Ampollas.	Antiulceroso.	UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MÉDICA	– Proteger las ampollas de la luz.
A03FA01	METOCLOPRAMIDA	Comprimidos. Ampollas.	Antiemético.	NO TOMAR EN CASO DE... – Problemas de estómago (hemorragias, perforaciones). PRECAUCIÓN EN CASO DE... – Problemas graves de riñón.	– No se aconseja el manejo de maquinaria peligrosa o de precisión durante el tratamiento.
A06AD1	LACTULOSA	Solución oral.	Laxante.	NO TOMAR EN CASO DE... – Obstrucción intestinal. PRECAUCIÓN EN CASO DE... – Diabetes.	– Puede producirse un oscurecimiento del color, propio de las soluciones azucaradas, que no afecta a la acción terapéutica.
A06AG	LAURILSULFATO SÓDICO, ACETATO + SODIO, CITRATO, DIHIDRATO	Canuletas rectales.	Laxante.	UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MÉDICA	– Tras quitar el capuchón que cierra el extremo de la cánula, colocar ésta en posición vertical con la punta hacia arriba y oprimir ligeramente hasta que unas gotas humedezcan el extremo de la cánula a fin de facilitar su introducción en el recto. Una vez introducida en el recto, apretar el envase hasta vaciar todo el contenido de la cánula y retirar suavemente sin dejar de presionar sobre sus paredes.
A07DA03	LOPERAMIDA	Cápsulas.	Antidiarreico.	UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MÉDICA	

■ Sólo en Botiquines tipo A.

CAJÓN 2 (Continuación)

Código ATC	Principio activo	Forma farmacéutica	Acción-efecto	Contraindicaciones y precauciones	Advertencias, condiciones de uso y conservación
A03AX13	DIMETICONA	Grageas.	Antidiarreico.	PRECAUCIÓN EN CASO DE... – Embarazo.	
C05AX	RUSCOGENINA + TRIMEBUTINA	Pomada rectal.	Antihemorroidal.		
A07BA01	CARBÓN ACTIVADO	Granulado para preparación de suspensión.	Absorbente intestinal.	UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MEDICA	

CAJÓN 3: ANALGÉSICOS, ANTIPIRÉTICOS, ANTIINFLAMATORIOS Y ESPASMOLÍTICOS

Código ATC	Principio activo	Forma farmacéutica	Acción-efecto	Contraindicaciones y precauciones	Advertencias, condiciones de uso y conservación
N02BE01	PARACETAMOL	Comprimidos.	Analgésico, antiinflamatorio, antipirético.	PRECAUCIÓN EN CASO DE... <ul style="list-style-type: none"> – Problemas de hígado. – Anemia. – Problemas de corazón y/o pulmón. – Dependencia alcohó 	
N02BA01	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO	Comprimidos.	Analgésico, antiinflamatorio, antipirético.	NO TOMAR EN CASO DE... <ul style="list-style-type: none"> – Alergia al medicamento. – Úlcera de estómago o duodeno. – Alteraciones de riñón. – Alteración de coagulación de la sangre. PRECAUCIÓN EN CASO DE... <ul style="list-style-type: none"> – Asma. – Alteraciones de hígado. 	<ul style="list-style-type: none"> – Ingerir los comprimidos preferentemente después de las comidas. – Evitar la ingesta de bebidas alcohólicas durante el tratamiento.
M02AA	PIKETOPROFENO	Aerosol.	Analgésico, antiinflamatorio, antipirético.		<ul style="list-style-type: none"> – No aplicar sobre mucosas, heridas ni ojos. – Lavar las manos después de cada aplicación. – No exponer al sol las zonas tratadas.
M01AB05	DICLOFENACO SÓDICO	Comprimidos. Ampollas.	Analgésico, antiinflamatorio, antipirético.	UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MEDICA	
N02BB02	METAMIZOL	Cápsulas. Ampollas.	Analgésico, antiinflamatorio, antipirético.	UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MEDICA	
N02AA01	CLORURO MÓRFICO	Ampollas.	Analgésico opiáceo.	UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MEDICA	
N02AX02	TRAMADOL CLORHIDRATO	Cápsulas. Ampollas.		UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MEDICA	

■ Sólo en botiquines tipo A.

CAJÓN 3 (Continuación)

Código ATC	Principio activo	Forma farmacéutica	Acción-efecto	Contraindicaciones y precauciones	Advertencias, condiciones de uso y conservación
A03BB	BUTILESCOPOLAMINA, BROMURO	Comprimidos. Ampollas.	Espasmolítico.	<p>NO TOMAR EN CASO DE...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Glaucoma. - Problemas de próstata. <p>PRECAUCIÓN EN CASO DE...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Problemas de riñón. - Taquicardia. - Esofagitis por reflujo. 	
V03AB15	NALOXONA	Ampollas.	Antagonista opiáceo.	<p>NO TOMAR EN CASO DE...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alergia al medicamento. <p>PRECAUCIÓN EN CASO DE...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personas que hayan recibido dosis altas de narcóticos y aquellas que tengan dependencia a los opiáceos. 	

CAJÓN 4: SISTEMA NERVIOSO

Código ATC	Principio activo	Forma farmacéutica	Acción-efecto	Contraindicaciones y precauciones	Advertencias, condiciones de uso y conservación
N05BA06	LORAZEPAM	Comprimidos.	Ansiolítico.	<p>NO TOMAR EN CASO DE...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alergia al medicamento o a las benzodiazepinas. - Miastenia gravis. - Problemas respiratorios o hepáticos graves. - Síndrome de apnea del sueño. 	<ul style="list-style-type: none"> - No se aconseja el manejo de maquinaria peligrosa o de precisión durante el tratamiento. - Evitar el consumo de bebidas alcohólicas.
N05BA01	DIAZEPAM	Comprimidos. Ampollas. Enemas.	Anticonvulsivante.	<p>NO TOMAR EN CASO DE...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alergia al medicamento. - Inconsciencia. - Tensión ocular alta. <p>PRECAUCIÓN EN CASO DE...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alteración del hígado o riñón. 	<ul style="list-style-type: none"> - No se aconseja el manejo de maquinaria peligrosa o de precisión durante el tratamiento. - Evitar el consumo de bebidas alcohólicas o antidepresivos.
N05AD01	HALOPERIDOL	Solución oral (gotas). Ampollas.	Neuroleptico. Antipsicótico.	<p>UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MÉDICA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - No se aconseja el manejo de maquinaria peligrosa o de precisión durante el tratamiento.
R06AA	DIMENHIDRINATO	Comprimidos. Supositorios.	Anticinetótico.	<p>PRECAUCIÓN EN CASO DE...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alteraciones de próstata. - Tensión ocular alta. - Asma. - Arritmias cardíacas. - Obstrucción digestiva o renal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Administrar el medicamento junto con alimentos o bebidas que no sen alcohólicas. - No tomar el sol durante el tratamiento. - Evitar la exposición a temperaturas extremas durante la utilización de este medicamento, manteniéndose en un ambiente fresco, hidratándose adecuadamente. - No se aconseja el manejo de maquinaria peligrosa o de precisión durante el tratamiento.
N04AA02	BIPERIDENO	Ampollas.	Antiparkinsoniano. Anticolinérgico.	<p>NO TOMAR EN CASO DE...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Glaucoma. - Estenosis mecánica tracto gastrointestinal. - Megacolon. <p>PRECAUCIÓN EN CASO DE...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alteración próstata. - Enfermedades cardíacas (taquicardias). 	<ul style="list-style-type: none"> - Evitar la exposición prolongada a temperaturas extremas (riesgo hipertermia). - Evitar cambios rápidos de postura (riesgo de aturdimiento o mareo al levantarse) y el consumo de alcohol. - No suspender el tratamiento sin consejo médico. - No se aconseja el manejo de maquinaria peligrosa o de precisión durante el tratamiento.

CAJÓN 5: ANTIALÉRGICOS Y ANTIANAFILÁCTICOS

Código ATC	Principio activo	Forma farmacéutica	Acción-efecto	Contraindicaciones y precauciones	Advertencias, condiciones de uso y conservación
R06AE07	CETIRIZINA	Comprimidos.	Antihistamínico.	<p>NO TOMAR EN CASO DE...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alergia al medicamento. - Enfermedades del riñón. - Embarazo. 	<ul style="list-style-type: none"> - No tomar el sol durante el tratamiento. - No se aconseja el manejo de maquinaria peligrosa o de precisión durante el tratamiento.
H02AB04	METILPREDNISOLONA	Comprimidos. Ampollas.	Glucocorticoide.	<p>NO TOMAR EN CASO DE...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alergia al medicamento. - Evitar tratamientos prolongados en caso de: enfermedades del corazón, úlcera péptica, gastritis, esofagitis, diabetes, tuberculosis. <p>PRECAUCIÓN EN CASO DE...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Osteoporosis. - Glaucoma. - Alteraciones psíquicas. - Infecciones graves. 	<ul style="list-style-type: none"> - No interrumpir el tratamiento bruscamente sin consentimiento del médico. - No administrar junto a vacunas. - En tratamientos prolongados, evitar la suspensión brusca del medicamento.

CAJÓN 6: APARATO RESPIRATORIO

Código ATC	Principio activo	Forma farmacéutica	Acción-efecto	Contraindicaciones y precauciones	Advertencias, condiciones de uso y conservación
R03CC02	SALBUTAMOL	Suspensión presurizada para inhalación.	Antiasmático.	UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MÉDICA NO TOMAR EN CASO DE... – Alergia al medicamento. – Tos persistente (tabaco, asma o enfisema) o productiva. – En pacientes en tratamiento con antidepresivos. PRECAUCIÓN EN CASO DE... – Dependencia al alcohol, epilepsia, mujeres embarazadas (contiene alcohol).	– Beber abundante cantidad de agua. – No se aconseja el manejo de maquinaria peligrosa o de precisión durante el tratamiento.
R05DA09	DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO	Comprimidos. Jarabe.	Antitusivo.		
R01AA05	OXIMETAZOLINA O SIMILAR	Nebulizador.	Preparado nasal: simpaticomimético.		– Mantener una correcta higiene nasal y del aplicador. – Se recomienda no superar las dosis diarias recomendadas ni utilizar más de tres días seguidos para evitar la congestión de rebote.
R05CB01	ACETILCISTEÍNA	Sobres.	Mucolítico.	NO TOMAR EN CASO DE... – Alergia al medicamento. PRECAUCIÓN EN CASO DE... – Asma. – Úlcera gastrointestinal.	– Beber abundante cantidad de agua.

CAJÓN 7: OJOS, OÍDOS, BOCA Y GARGANTA

Código ATC	Principio activo	Forma farmacéutica	Acción-efecto	Contraindicaciones y precauciones	Advertencias, condiciones de uso y conservación
S01AA12	TOBRAMICINA	Colirio. Ungüento.	Antiinflamatorio.	NO TOMAR EN CASO DE... – Alergia a antibióticos aminoglucósidos.	– Para la aplicación correcta: lávese las manos, mire hacia arriba, tire hacia abajo del párpado inferior para hacer un saco y lleve el cuentagotas o el tubo lo más cerca posible del saco sin llegar a tocar el ojo para evitar la contaminación del medicamento. – Los colirios y pomadas son de uso personal. No debe compartir su uso con otros pacientes.
S01CA	DEXAMETASONA + POLIMIXINA B + NEOMICINA	Colirio.	Antiinflamatorio.	UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MÉDICA	
S01JA	OXIBUPROCAÍNA + FLUORESCÉINA	Colirio.	Anestésico local + agente diagnóstico para exploraciones oculares.	NO TOMAR EN CASO DE... – Alergia al medicamento.	– Esperar al menos cinco minutos antes de utilizar otros preparados por vía oftálmica. No se recomienda el uso prolongado (riesgo de pérdida de visión por opacificación corneal).
S01ED01	TIMOLOL	Colirio.	Miótico hipotensor.	UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MÉDICA	
S01FA	CICLOPENTOLATO	Colirio.	Miátrico ciclopléjico.	UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MÉDICA	
S01GA	HIDROCLORURO FENILEFRINA	Colirio.	Descongestivo ocular.	NO TOMAR EN CASO DE... – Alergia al medicamento. – Glaucoma ángulo estrecho.	
S02CA	NEOMICINA + POLIMIXINA B + FLUOCINOLONA	Gotas óticas.	Antiinflamatorio.	UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MÉDICA	
S02DA	TETRACAÍNA + ACEITE DE CLAVO	Gotas óticas.	Anestésico, antiséptico.	UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MÉDICA	
A01AB	HEXETIDINA	Solución.	Antiséptico.		– Lavados bucales o gargarismos con 15 ml durante 30 segundos. También puede aplicarse tópicamente con una torunda de algodón durante varios minutos.

CAJÓN 8: ANTIBIÓTICOS Y ANTIINFECCIOSOS

Código ATC	Principio activo	Forma farmacéutica	Acción-efecto	Contraindicaciones y precauciones	Advertencias, condiciones de uso y conservación
J01CA04	AMOXICILINA	Cápsulas.	Antibiótico.	UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MÉDICA	
J01CR	AMOXICILINA + CLAVULANICO	Sobres.	Antibiótico.	UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MÉDICA	
J01CE08	BENCILPENICILINA-BENZATINA	Vial.	Antibiótico.	UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MÉDICA	
J01AA02	DOXICICLINA	Cápsulas.	Antibiótico.	UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MÉDICA	
J01FA09	CLARITROMICINA	Comprimidos.	Antibiótico.	UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MÉDICA	
J01CF02	CLOXACILINA	Cápsulas. Vial.	Antibiótico.	UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MÉDICA	
J01GB03	GENTAMICINA	Vial.	Antibiótico.	UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MÉDICA	
J01EA01	TRIMETOPRIMA + SULFA-METOXAZOL	Comprimidos.	Sulfamida antibacteriana.	UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MÉDICA	
J01XD01	METRONIDAZOL	Comprimidos.	Antiparasitario.	UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MÉDICA	
P02CA01	MEBENDAZOL	Comprimidos.	Antiparasitario.	UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MÉDICA	
J01MA02	CIPROFLOXACINO	Comprimidos.	Antiinfeccioso intestinal.	UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MÉDICA	
J07AM01	VACUNA ANTITETÁNICA	Vial.	Antitetánico.	UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MÉDICA	- Precisa conservación en nevera.
J06BB02	GAMMAGLOBULINA ANTITETÁNICA	Vial.	Antitetánico.	NO TOMAR EN CASO DE... - Alergia al medicamento.	- Precisa conservación en nevera.

Sólo en Botiquines tipo A.

CAJÓN 8 (Continuación)

Código ATC	Principio activo	Forma farmacéutica	Acción-efecto	Contraindicaciones y precauciones	Advertencias, condiciones de uso y conservación
P01BA01	CLOROQUINA	Comprimidos.	Antipalúdico.	UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MÉDICA	– Sólo obligatorio en buques que frecuenten o faenen en zonas palúdicas.
P01BA	QUININA	Ampollas.	Antipalúdico.	UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MÉDICA	– Sólo obligatorio en buques que frecuenten o faenen en zonas palúdicas.
	MEFLOQUINA	Comprimidos.	Antipalúdico.	UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MÉDICA	– Sólo obligatorio en buques que frecuenten o faenen en zonas palúdicas.
P01AX06	ATOVAQUONA + PROGUANIL	Comprimidos.	Antipalúdico.	UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MÉDICA	– Sólo obligatorio en buques que frecuenten o faenen en zonas palúdicas.

CAJÓN 9: ANESTÉSICOS LOCALES

Código ATC	Principio activo	Forma farmacéutica	Acción-efecto	Contraindicaciones y precauciones	Advertencias, condiciones de uso y conservación
N01BX01	CLORURO DE ETILO	Aerosol.	Anestésico por frío.	NO TOMAR EN CASO DE... – Alergia al medicamento.	
N01BB02	LIDOCAÍNA	Mimiplasco. Solución.	Anestésico local, inyectable.	NO TOMAR EN CASO DE... – Alergia al medicamento o anestésicos locales. PRECAUCIÓN EN CASO DE... – Epilepsia. – Alteraciones ritmo cardíaco. – Shock grave. – Enfermedades del hígado o riñón. – Porfiria. – Embarazo.	
R02AD01	BENZOCAÍNA		Anestésico dental.	NO TOMAR EN CASO DE... – Alergia al medicamento.	<ul style="list-style-type: none"> – Inflamable. No fumar durante su aplicación. – No masticar alimentos o chicles mientras persiste el entumecimiento (riesgo de mordedura de la lengua o de la mucosa oral). – No comer en la hora siguiente a su aplicación ni pulverizar en la garganta (riesgo de aspiración).

■ Sólo en Botiquines tipo A.

CAJÓN 10: USO DERMATOLÓGICO

Código ATC	Principio activo	Forma farmacéutica	Acción-efecto	Contraindicaciones y precauciones	Advertencias, condiciones de uso y conservación
D06AX09	MUPIROCINA	Crema.	Pomada antibiótica.	UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MÉDICA	
D07CC	BETAMETASONA + GENTAMICINA	Crema.	Pomada antiinflamatoria-analgésica.	UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MÉDICA	
D01AC08	KETOCONAZOL	Gel.	Antimicótico local.	UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MÉDICA	
D08AF01	NITROFURAL	Pomada.	Preparado para quemaduras.	NO TOMAR EN CASO DE... – Alergia al medicamento.	– Si se aplica más de cinco días seguidos, en ocasiones puede producir reacciones alérgicas en la piel.
P03AC04	PERMETRINA	Gel-loción.	Solución antiparasitaria.		

■ Sólo en Botiquines tipo A.

CAJÓN 13: REHIDRATACIÓN, APOORTE CALÓRICO, SUEROS Y VITAMINAS

Código ATC	Principio activo	Forma farmacéutica	Acción-efecto	Contraindicaciones y precauciones	Advertencias, condiciones de uso y conservación
	CL SÓDICO + CL POTÁSICO + GLUCOSA + BICARBONATO SÓDICO	Sobres para disolución.	Rehidratación oral.	NO TOMAR EN CASO DE... – Poca o nula emisión de orina. – Vómitos frecuentes. – Obstrucción intestinal. – Enfermedad renal.	
	SUERO SALINO FISIOLÓGICO AL 0,9%	Solución parenteral.	Rehidratación.	UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MÉDICA	
	COMPLEJO VITAMÍNICO B	Ampollas.	Vitaminas.	UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MÉDICA	
A11DA	TIAMINA (VITAMINA B1)	Ampollas.	Vitaminas	NO TOMAR EN CASO DE... – Alergia al medicamento. – Embarazo.	

■ Sólo en Botiquines tipo A.

CAJÓN 14: ANTISÉPTICOS Y MATERIAL DE CURA

Código ATC	Principio activo	Forma farmacéutica	Acción-efecto	Contraindicaciones y precauciones	Advertencias, condiciones de uso y conservación
D08AG02	POVIDONA	Solución dérmica.	Antiséptico.	NO TOMAR EN CASO DE... – Alergia al yodo.	– El yodo pierde actividad en presencia de materia orgánica.
D08AC	CLORHEXIDINA	Solución.	Antiséptico.	NO TOMAR EN CASO DE... – Alergia al medicamento o anestésicos locales. – Perforación del tímpano (riesgo de sordera si se instila en el oído).	– No aplicar en ojos ni oídos. – Proteger de la luz y del calor. – Las ropas deberán renovarse semanalmente. – Las ropas tratadas no se lavarán con lejía ni hipocloritos.
D08AJ	ALCOHOL DE 70°	Solución.	Antiséptico.		– No aplicar sobre piel erosionada.
D08AX	AGUA OXIGENADA	Solución.	Antiséptico.		– Efecto corto, no se aconseja usar como único antiséptico. – Utilización sin diluir en lavado de heridas. – Diluir en agua al 50% en enjuagues o jargarismos estomatológicos. – No aplicar en ojos ni en cavidades cerradas.

OTRO MATERIAL FUERA DE CAJONES

Código ATC	Principio activo	Forma farmacéutica	Acción-efecto	Contraindicaciones y precauciones	Advertencias, condiciones de uso y conservación
	OXÍGENO (MALETÍN CON EQUIPO DE REANIMACIÓN)			NO TOMAR EN CASO DE... – Mala tolerancia al oxígeno.	– No usar cerca de fuentes de calor o de fuego. ¡Riesgo de explosión!

BOTIQUÍN TIPO C / BOTES SALVAVIDAS

Código ATC	Principio activo	Forma farmacéutica	Acción-efecto	Contraindicaciones y precauciones	Advertencias, condiciones de uso y conservación
C01CA24	EPINEFRINA (ADRENALINA)	Solución en jeringa precargada (autoinyector).	Estimulante cardíaco. Simpaticomimético. Tratamiento de emergencia en shock anafiláctico o reacción alérgica grave.	<p>NO TOMAR EN CASO DE...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alergia a este medicamento. - Antecedentes de problemas cardíacos. - Aumento de la tensión ocular (glaucoma). - Estrechamiento de los vasos sanguíneos (arterioesclerosis). <p>PRECAUCIÓN EN CASO DE...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diabetes. - Tensión arterial alta. - Problemas psiquiátricos. - Hipertiroidismo. - Embarazo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Un solo uso (desechar inmediatamente el autoinyector tras su utilización). - No debe emplearse si la solución es de color pardo o contiene precipitados. - Inyectar en cara externa del muslo. - Conservar el envase protegido de la luz. - No refrigerar o congelar.
C01DA	NITROGLICERINA	Comprimidos sublinguales.	Antianginoso.	<p>NO TOMAR EN CASO DE...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Infarto de miocardio reciente. - Shock circulatorio. - Embarazo. <p>PRECAUCIÓN EN CASO DE...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aumento tensión ocular. - Anemia. Hipotiroidismo. - Traumatismo craneal. - Hemorragias cerebrales. - Problemas cardíacos. - Enfermedades hepáticas o renales graves. 	<ul style="list-style-type: none"> - Introducir el comprimido en la boca, masticar seguidamente y situarlo debajo de la lengua. - Evitar llevar el envase cerca del cuerpo, el propio calor corporal puede afectar al medicamento. - Evitar el consumo de bebidas alcohólicas.
G02AB01	METILERGOMETRINA	Solución oral (gotas).	Estimulante uterino y vasoconstrictor.	<p>UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MÉDICA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sólo obligatorio en buques con mujeres a bordo. - Proteger de la luz. - Conservar entre 2-8° C (en nevera).
C09AA01	CAPTOPRIL	Comprimidos.	Antihipertensivo.		<ul style="list-style-type: none"> - No mantener a temperaturas superiores a 30° C. - No se aconseja el manejo de maquinaria peligrosa o de precisión durante el tratamiento.

■ Sólo en buques que faenen o naveguen entre 10 y 60 millas náuticas de la costa.

BOTIQUÍN TIPO C / BOTES SALVAVIDAS (Continuación)

Código ATC	Principio activo	Forma farmacéutica	Acción-efecto	Contraindicaciones y precauciones	Advertencias, condiciones de uso y conservación
A02AD	ALGELDRAATO + HIDROXIDO DE MAGNESIO	Suspensión oral. Comprimidos.	Antiácido.	NO TOMAR EN CASO DE... – Problemas renales. – Embarazo.	– Agitar energicamente el frasco antes de su uso (suspensión). – Los comprimidos deben masticarse perfectamente antes de tragarse. Después, a continuación, tomar un vaso de agua. – No tomar con leche.
A03FA01	METOCLOPRAMIDA	Comprimidos. Solución inyectable.	Antiemético.	NO TOMAR EN CASO DE... – Problemas de estómago (hemorragias, perforaciones). PRECAUCIÓN EN CASO DE... – Problemas graves de riñón.	– No se aconseja el manejo de maquinaria peligrosa o de precisión durante el tratamiento.
A07DA03	LOPERAMIDA	Cápsulas.	Antidiarreico.	UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MÉDICA	
N02BE01	PARACETAMOL	Comprimidos.	Analgésico, antiinflamatorio, antipirético.	PRECAUCIÓN EN CASO DE... – Problemas de hígado. – Anemia. – Problemas de corazón y/o pulmón. – Dependencia alcohol.	
N02BA01	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO	Comprimidos.	Analgésico, antiinflamatorio, antipirético.	NO TOMAR EN CASO DE... – Alergia al medicamento. – Úlcera de estómago o duodeno. – Alteraciones de riñón. – Alteración de coagulación de la sangre. PRECAUCIÓN EN CASO DE... – Asma. – Alteraciones de hígado.	– Ingerir los comprimidos preferentemente después de las comidas. – Evitar la ingesta de bebidas alcohólicas durante el tratamiento.
M02AA	PIKETOPROFENO	Aerosol.	Analgésico, antiinflamatorio, antipirético.		– No aplicar sobre mucosas, heridas ni ojos. – No exponer al sol las zonas tratadas. – Lavar las manos después de cada aplicación.
M01AB05	DICLOFENACO SÓDICO	Comprimidos. Ampollas.	Analgésico, antiinflamatorio, antipirético.	UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MÉDICA	

Solo en buques que faenen o naveguen entre 10 y 60 millas náuticas de la costa.

Código ATC	Principio activo	Forma farmacéutica	Acción-efecto	Contraindicaciones y precauciones	Advertencias, condiciones de uso y conservación
N02BB02	METAMIZOL	Cápsulas. Ampollas.	Analgésico, antinflamatorio, antipirético.	UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MÉDICA	
N05BA01	DIAZEPAM	Comprimidos. Ampollas. Enemas.	Anticonvulsivante.	NO TOMAR EN CASO DE... – Alergia al medicamento. – Inconsciencia. PRECAUCIÓN EN CASO DE... – Alteración del hígado o riñón.	– Evitar el consumo de bebidas alcohólicas o antidepresivos. – No se aconseja el manejo de maquinaria peligrosa o de precisión durante el tratamiento.
N05AD01	HALOPERIDOL	Solución oral (gotas). Ampollas.	Neuroléptico. Antipsicótico.	UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MÉDICA	– No se aconseja el manejo de maquinaria peligrosa o de precisión durante el tratamiento.
R06AA	DIMENHIDRINATO	Comprimidos. Supositorios.	Anticinetótico.	PRECAUCIÓN EN CASO DE... – Alteraciones de próstata. – Tensión ocular alta. – Asma. – Arritmias cardíacas. – Obstrucción digestiva o renal.	– Administrar el medicamento junto con alimentos o bebidas que no sean alcohólicas. – No tomar el sol durante el tratamiento. – Evitar la exposición a temperaturas extremas durante la utilización de este medicamento, manteniéndose en un ambiente fresco, hidratándose adecuadamente. – No se aconseja el manejo de maquinaria peligrosa o de precisión durante el tratamiento.
R06AE07	CETIRIZINA	Comprimidos.	Antihistamínico.	NO TOMAR EN CASO DE... – Alergia al medicamento. – Enfermedades del riñón. – Embarazo.	– No tomar el sol durante el tratamiento. – No se aconseja el manejo de maquinaria peligrosa o de precisión durante el tratamiento.

■ Sólo en buques que faenen o naveguen entre 10 y 60 millas náuticas de la costa.

BOTIQUÍN DE BALSAS DE SALVAMENTO

Código ATC	Principio activo	Forma farmacéutica	Acción-efecto	Contraindicaciones y precauciones	Advertencias, condiciones de uso y conservación
C01DA	NITROGLICERINA	Comprimidos sublinguales.	Antianginoso.	<p>NO TOMAR EN CASO DE...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Infarto de miocardio reciente. - Shock circulatorio. - Embarazo. <p>PRECAUCIÓN EN CASO DE...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aumento tensión ocular. - Anemia. Hipotiroidismo. - Traumatismo craneal. - Hemorragias cerebrales. - Problemas cardíacos. - Enfermedades hepáticas o renales graves. 	<ul style="list-style-type: none"> - Introducir el comprimido en la boca, masticar seguidamente y situarlo debajo de la lengua. - Evitar llevar el envase cerca del cuerpo, el propio calor corporal puede afectar al medicamento. - Evitar el consumo de bebidas alcohólicas.
G02AB01	METILERGOMETRINA	Solución oral (gotas).	Estimulante uterino y vasoconstrictor.	<p>UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MÉDICA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Proteger de la luz. - Conservar entre 2-8° C (en nevera). - Sólo obligatorio en buques con mujeres a bordo.
A03FA01	METOCLOPRAMIDA	Comprimidos. Solución inyectable.	Antiemético.	<p>NO TOMAR EN CASO DE...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Problemas de estómago (hemorragias, perforaciones). <p>PRECAUCIÓN EN CASO DE...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Problemas graves de riñón. 	<ul style="list-style-type: none"> - No se aconseja el manejo de maquinaria peligrosa o de precisión durante el tratamiento.
A07DA03	LOPERAMIDA	Cápsulas.	Antidiarreico.	<p>UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MÉDICA</p>	
N02BA01	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO	Comprimidos.	Analgésico, antiinflamatorio, antipirético.	<p>NO TOMAR EN CASO DE...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alergia al medicamento. - Úlcera de estómago o duodeno. - Alteraciones de riñón. - Alteración de coagulación de la sangre. <p>PRECAUCIÓN EN CASO DE...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asma. - Alteraciones de hígado. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ingerir los comprimidos preferentemente después de las comidas. - Evitar la ingesta de bebidas alcohólicas durante el tratamiento.
N02BB02	METAMIZOL	Cápsulas. Ampollas.	Analgésico, antiinflamatorio, antipirético.	<p>UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MÉDICA</p>	

Código ATC	Principio activo	Forma farmacéutica	Acción-efecto	Contraindicaciones y precauciones	Advertencias, condiciones de uso y conservación
R06AA	DIMENHIDRINATO	Comprimidos. Supositorios.	Anticinetósico.	PRECAUCIÓN EN CASO DE... – Alteraciones de próstata. – Tensión ocular alta. – Asma. – Arritmias cardíacas. – Obstrucción digestiva o renal.	– Administrar el medicamento junto con alimentos o bebidas que no sean alcohólicas. – No tomar el sol durante el tratamiento. – Evitar la exposición a temperaturas extremas durante la utilización de este medicamento, manteniéndose en un ambiente fresco, hidratándose adecuadamente. – No se aconseja el manejo de maquinaria peligrosa o de precisión durante el tratamiento.
D08AG02	POVIDONA	Solución dérmica.	Antiséptico.	NO TOMAR EN CASO DE... – Alergia al yodo.	– El yodo pierde actividad en presencia de materia orgánica.

BOTIQUÍN DE ANTÍDOTOS: ANTÍDOTOS GENERALES*

Código ATC	Principio activo	Forma farmacéutica	Acción-efecto	Contraindicaciones y precauciones	Advertencias, condiciones de uso y conservación
C03CA01	FUROSEMIDA	Comprimidos. Solución inyectable.	Diurético.	NO TOMAR EN CASO DE... – Alergia a la furosemida. – Problemas de riñón. PRECAUCIÓN EN CASO DE... – Diabetes. – Gota. – Sordera. – Problemas hepáticos.	– Conservar las ampollas resguardadas de la luz. – No utilizar si la solución adquiere color parduzco. – No se aconseja el manejo de maquinaria peligrosa o de precisión durante el tratamiento.
B02BA01	FITOMENADIONA	Ampollas.	Antihemorrágico.	NO TOMAR EN CASO DE... – Hipersensibilidad al medicamento.	
	HIDRÓXIDO DE ALUMINIO + MAGNESIO	Solución oral.	Antiácido.	NO TOMAR EN CASO DE... – Problemas de riñón.	
A03FA01	METOCLOPRAMIDA	Ampollas.	Antiemético.	NO TOMAR EN CASO DE... – Problemas de estómago (hemorragias, perforaciones). PRECAUCIÓN EN CASO DE... – Problemas graves de riñón.	– No se aconseja el manejo de maquinaria peligrosa o de precisión durante el tratamiento.
A07BA	CARBÓN ACTIVADO	Frascos granulados.		UTILIZAR SÓLO DESPUÉS DE LA CONSULTA RADIO-MÉDICA	– No administrar alimentos y/o medicamentos simultáneamente para evitar la pérdida de adsorción (dejar transcurrir al menos dos horas). – Agitar la suspensión antes de usar. – No utilizar la suspensión pasadas 72 horas desde su preparación.
N02BE01	PARACETAMOL	Comprimidos.	Analgésico, antiinflamatorio, antipirético.	PRECAUCIÓN EN CASO DE... – Problemas de hígado. – Anemia. – Problemas de corazón y/o pulmón. – Dependencia alcohol.	

Código ATC	Principio activo	Forma farmacéutica	Acción-efecto	Contraindicaciones y precauciones	Advertencias, condiciones de uso y conservación
N02BA01	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO	Comprimidos.	Analgésico, antiinflamatorio, antipirético.	<p>NO TOMAR EN CASO DE...</p> <ul style="list-style-type: none"> – Alergia al medicamento. – Úlcera de estómago o duodeno. – Alteraciones de riñón. – Alteración de coagulación de la sangre. <p>PRECAUCIÓN EN CASO DE...</p> <ul style="list-style-type: none"> – Asma. – Alteraciones de hígado. 	<ul style="list-style-type: none"> – Ingerir los comprimidos preferentemente después de las comidas. – Evitar la ingesta de bebidas alcohólicas durante el tratamiento.
N02AD01	PENTAZOCINA	Ampollas.	Analgésico opiáceo.	<p>NO TOMAR EN CASO DE...</p> <ul style="list-style-type: none"> – Problemas respiratorios graves. – Traumatismo craneal. – Convulsiones. – Intoxicación aguda por alcohol y <i>delirium tremens</i>. <p>PRECAUCIÓN EN CASO DE...</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tratamiento con antidepresivos. – Enfermedad del hígado o riñón grave. – Colecistitis y pancreatitis. 	<ul style="list-style-type: none"> – La administración repetida puede causar dependencia. – La interrupción brusca del tratamiento, en pacientes con dependencia física, puede ocasionar un síndrome de abstinencia.
N05BA01	DIAZEPAN	Microenemas.	Anticonvulsivo. Ansiolítico.	<p>NO TOMAR EN CASO DE...</p> <ul style="list-style-type: none"> – Alergia al medicamento. – Inconsciencia. – Tensión ocular alta. <p>PRECAUCIÓN EN CASO DE...</p> <ul style="list-style-type: none"> – Alteración del hígado o riñón. 	<p>No se aconseja el manejo de maquinaria peligrosa o de precisión durante el tratamiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Evitar el consumo de bebidas alcohólicas o antidepresivos.
R06AD02	PROMETAZINA	Ampollas.	Antialérgico. Antianafláctico.	<p>NO TOMAR EN CASO DE...</p> <ul style="list-style-type: none"> – Alergia al medicamento o a fenotiazinas. – Problemas urológicos o prostáticos. – Glaucoma. <p>PRECAUCIÓN EN CASO DE...</p> <ul style="list-style-type: none"> – Alteraciones de la médula ósea. – Alteraciones cardiovasculares. – Insuficiencia hepática o renal grave. – Vómitos graves. 	<ul style="list-style-type: none"> – Este medicamento se administrará junto con las comidas. <p>No se aconseja el manejo de maquinaria peligrosa o de precisión durante el tratamiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> – No tomar el sol durante el tratamiento ni exponerse a temperaturas extremas. – Notificar al médico cualquier patología crónica antes de iniciar el tratamiento.

* Obligatorios en **TODOS** los buques que **TRANSPORTEN SUSTANCIAS PELIGROSAS** independientemente de la naturaleza de éstas.

BOTIQUÍN DE ANTÍDOTOS: ANTÍDOTOS GENERALES* (Continuación)

Código ATC	Principio activo	Forma farmacéutica	Acción-efecto	Contraindicaciones y precauciones	Advertencias, condiciones de uso y conservación
R06AB02	DEXCLORFENIRAMINA	Ampollas.	Antialérgico. Antianafiláctico.	NO TOMAR EN CASO DE... - Alergia al medicamento o antihistamínicos similares. PRECAUCIÓN EN CASO DE... - Hipertensión arterial. - Aumento de la tensión ocular. - Problemas graves de corazón. - Úlcera péptica. - Hipertiroidismo, glaucoma, asma.	<ul style="list-style-type: none"> - No se aconseja el manejo de maquinaria peligrosa o de precisión durante el tratamiento. - No tomar el sol durante el tratamiento. - Notificar al médico cualquier patología crónica antes de iniciar el tratamiento.
R03CC02	SALBUTAMOL	Aerosol inhalador.	Antibroncoespasmo. Broncodilatador.	NO TOMAR EN CASO DE... - Alergia al salbutamol. PRECAUCIÓN EN CASO DE... - Hipertensión arterial. - Enfermedad del corazón. - Diabetes.	<ul style="list-style-type: none"> - Este medicamento debe administrarse sólo cuando aparezcan síntomas de asma. - La inspiración debe ser lenta y constante y debe efectuarse según las indicaciones incluidas en el prospecto. - Si el paciente precisa más de una inhalación deberá esperar al menos un minuto entre cada dosis. - Si aparecen jadeos o ruidos al respirar tras administrar el medicamento, consultar inmediatamente con el médico. - No superar la dosis recomendada. - Tras la administración se recomienda enjuagarse la boca con agua.
R03BA01	BECLOMETASONA	Aerosol inhalador.	Antibroncoespasmo. Broncodilatador.	NO TOMAR EN CASO DE... - Alergia al medicamento. PRECAUCIÓN EN CASO DE... - Tuberculosis pulmonar. - Infecciones por virus u hongos de las vías respiratorias.	<ul style="list-style-type: none"> - No utilizar el medicamento para el tratamiento de crisis agudas. - La inspiración debe ser lenta y constante y debe efectuarse según las indicaciones incluidas en el prospecto. - Si el paciente precisa más de una inhalación deberá esperar al menos un minuto entre cada dosis. - Tras la administración se recomienda enjuagarse la boca con agua o lavarse los dientes. - No suspender bruscamente la administración del medicamento ni superar la dosis recomendada.

Código ATC	Principio activo	Forma farmacéutica	Acción-efecto	Contraindicaciones y precauciones	Advertencias, condiciones de uso y conservación
J01CA04	AMOXICILINA	Cápsulas. Vial.	Antibiótico.	NO TOMAR EN CASO DE... – Alergia a penicilinas y cefalosporinas. PRECAUCIÓN EN CASO DE... – Colitis ulcerosa. – Problemas de riñón.	
J01EE01	COTRIMOXAZOL	Comprimidos.	Sulfamida antibacteriana.	NO TOMAR EN CASO DE... – Alergia a sulfamidas, sulfonilureas anti-diabéticas o diuréticos tiazídicos. PRECAUCIÓN EN CASO DE... – Problemas de hígado o riñón. – Embarazo.	– Tomar con un vaso entero de agua. – Evite la exposición al sol (reacciones de fotosensibilidad).
N02AD01	TOBRAMICINA	Colirio.	Colirio antibiótico oftálmico.	NO TOMAR EN CASO DE... – Alergia a antibióticos aminoglucósidos.	– Para la aplicación correcta: lávese las manos, mire hacia arriba, tire hacia abajo del párpado inferior para hacer un saco y lleve el cuentagotas o el tubo lo más cerca posible del saco sin llegar a tocar el ojo para evitar la contaminación del medicamento. – Los colirios y pomadas son de uso personal. – No debe compartir su uso con otros pacientes.

* Obligatorios en **TODOS** los buques que **TRANSPORTEN SUSTANCIAS PELIGROSAS** independientemente de la naturaleza de éstas.

BOTIQUÍN DE ANTÍDOTOS: ANTÍDOTOS ESPECÍFICOS*

Código ATC	Principio activo	Forma farmacéutica	Sustancia peligrosa transportada	Contraindicaciones y precauciones	Advertencias, condiciones de uso y conservación
	DIMERCAPROL (Medicamento extranjero)	Vial.	<ul style="list-style-type: none"> - Arsénicos y sus compuestos. - Cloroarsinas. - Mercurio y sus compuestos. - Carbomilos. - Plomo y sus compuestos. - Cobre y sus compuestos. 	<p>NO TOMAR EN CASO DE...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Insuficiencia hepática. - Intoxicación por metil-mercurio, mercurio o selenio. - Alergia a los cacahuetes o derivados. - Problemas de riñón o tensión arterial alta. - Déficit de 4-P glucosa deshidrogenasa. 	
	HIDROXICOBALAMINA	Polvo para solución para perfusión.	<ul style="list-style-type: none"> - Cianuros. - Nitrilos. - Sulfuro de hidrógeno. - Cianuro de hidrógeno. - Cianógenos halogenados. 		<ul style="list-style-type: none"> - La piel, las mucosas y la orina pueden presentar una coloración roja, que desaparece al cabo de semanas.
A12AA03	GLUCONATO DE CALCIO AL 2% (Fórmula magistral)	Crema.	<ul style="list-style-type: none"> - Oxalatos. - Flúor y fluoruros. 	<p>NO TOMAR EN CASO DE...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alergia al medicamento. <p>PRECAUCIÓN EN CASO DE...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Problemas de riñón y corazón. - Sarcoidosis. - Piedras de riñón por calcio. - Toma de medicamentos por calcio. 	
	AZUL DE METILENO AL 1% (Fórmula magistral)	Ampolla bebible.	<ul style="list-style-type: none"> - Nitratos y nitritos. - Compuestos aminados y nitrados de la serie aromática. 	<p>NO TOMAR EN CASO DE...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alergia al producto. - Déficit de G-6PD. <p>PRECAUCIÓN EN CASO DE...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Problemas de riñón. 	
	ALCOHOL ETÍLICO AL 10% (Fórmula magistral: 100 cc alcohol 96° médico, sin pirógenos + 865,2 cc de agua)	Solución.	<ul style="list-style-type: none"> - Alcohol metílico (metanol). - Anticongelante (dilenglicol). 	<p>PRECAUCIÓN EN CASO DE...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enfermos que tomen medicación antialcohol (Disulfiram). 	

Código ATC	Principio activo	Forma farmacéutica	Sustancia peligrosa transportada	Contraindicaciones y precauciones	Advertencias, condiciones de uso y conservación
	SULFATO DE ATROPINA	Ampolla.	<ul style="list-style-type: none"> - Plaguicidas orgánicos fosforados y a base de carbamatos. - Nicotina y sus compuestos. - Fenoles. - Nitrofenoles. - Pícratos. 	<p>NO TOMAR EN CASO DE...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enfermedad de próstata. - Glaucoma. - Enfermedad de riñón. <p>PRECAUCIÓN EN CASO DE...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Insuficiencia renal. - Taquicardia. - Insuficiencia cardíaca. - Esófagitis, colitis ulcerosa. 	
	POLIETILENGLICOL Peso molecular 300	Frasco.		<p>NO TOMAR EN CASO DE...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alergia al medicamento. - Úlcera gastrointestinal. 	

* Obligatorios en los buques que transporten las sustancias peligrosas relacionadas.